

QUESTIONNAIRE MEDICAL PRIMO-VACCINATION ANTI-COVID

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M F

N° Sécurité Sociale :

Température à
l'arrivée :

Professionnel hospitalier et non hospitalier EN ACTIVITÉ :

CHG Sarreguemines CHS Sarreguemines Médico-social Libéral Autre

Profession :

CONTRE-INDICATIONS EVENTUELLES :

| | OUI | NON |
|---|-----|-----|
| Avez-vous reçu une vaccination grippe au cours des 3 dernières semaines? | | |
| Avez-vous reçu une autre vaccination au cours des 2 dernières semaines? | | |
| Avez-vous eu une infection Covid 19 symptomatique ? Si OUI, précisez : <input type="checkbox"/> Il y a moins de 3 mois <input type="checkbox"/> Il y a plus de 3 mois → Se prémunir de la preuve du résultat positif (PCR, test antigénique, sérologie) | | |
| Etes-vous cas contact d'une personne Covid 19+ ? Si oui, avez-vous été testé ? | | |
| Etes-vous asthmatique ? Etes-vous en crise actuellement ? Vous savez-vous allergique à un médicament ? Si oui, lequel ? | | |
| Avez-vous déjà présenté une réaction allergique autre que locale (rougeur de la zone injectée.....) à un vaccin ? Si oui lequel ? | | |
| Avez- vous déjà présenté une réaction allergique grave lors d'une infiltration articulaire ? Vous savez-vous allergique au polyethylene glycol ou macrogol ? | | |
| Souffrez-vous actuellement d'une infection aiguë avec fièvre ? | | |
| Etes-vous enceinte ou pensez-vous l'être ? | | |
| Envisagez-vous une grossesse dans les 3 prochains mois ? | | |

NB : Ne pas prévoir d'intervention chirurgicale réglée dans les 10 jours suivant une vaccination.

Les personnes immunodéprimées (personnes vivant avec le VIH, traitées par corticoïdes, par chimiothérapie etc...) peuvent être vaccinées car elles sont à risque d'infection Covid 19 sévère.

Pour les femmes en âge de procréer, éviter une grossesse dans les 3 mois qui suivent la 2ème injection.

Un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire n'est pas une contre-indication à la vaccination mais il faut être vigilant sur le risque de saignement au point d'injection.

Ne pas administrer d'autre vaccin entre les 2 injections du vaccin Covid 19.

Ne pas administrer d'autre vaccin dans les 15 jours qui suivent la 2ème injection.

